

CLINDAMYCINE® DALACINE® CLINDAMYCINE 75, 150 OU 300 MG GÉLULE



DE QUEL MEDICAMENT S'AGIT-IL?

C'est un antibiotique délivré sur prescription médicale, en pharmacie de ville.

COMMENT LE CONSERVER ?

Dans un endroit sec, à une température ne dépassant pas 25°C.

COMMENT PRENDRE MON MÉDICAMENT ?

Avalez-le avec un verre d'eau, au cours ou en dehors d'un repas. Ne pas ouvrir la gélule.

QUE FAIRE EN CAS D'OUBLI?

Ne doublez pas la dose et prenez la suivante à l'heure habituelle.

RECOMMANDATIONS

Un traitement antibiotique nécessite un suivi rigoureux de la dose et de la durée recommandée par votre médecin sur la prescription médicale Sinon : risque de reprise de l'infection

Ce médicament peut présenter des **interactions** avec d'autres médicaments Avant de prendre un **nouveau médicament**, contactez votre médecin ou pharmacien.

CONSEILS PRATIQUES



En cas de diarrhées, consultez directement votre médecin. Ne prenez pas d'anti-diarrhéiques (exemple: IMODIUM® Lopéramide).



Signalez à votre médecin toute allergie ultérieure à un antibiotique.

MANIFESTATIONS À SURVEILLER

(liste non exhaustive)



Altération du goût



Troubles au niveau du foie et du bilan sanguin.



Réaction d'hypersensibilité médicamenteuse ou cutanée sévère.



Douleurs abdominales, diarrhées, vomissements...



Mycose buccale (douleur et dépôts blanchâtres dans la bouche notamment sur la langue)



Déséquilibre de l'INR si traitement par antivitamine K (exemple : COUMADINE®, PREVISCAN®, SINTROM®)

Pour tout effet indésirable rencontré, consultez votre médecin ou demandez conseil à votre pharmacien!

on : équipe de la Pharmacie, Validation : C

Je suis suivi(e) dans le cadre d'une infection :
La durée initiale de mon traitement est (soumis à réévaluation par le médecin) :
Je dois prendre mon traitement :
Mon médecin infectiologue référent est :
Si je rencontre un problème, je contacte : Secrétariat du service d'Infectiologie : 02 62 35 91 65