

A domicile :



Pour vous-même et votre entourage:

Surveiller l'apparition de boutons, plaies, abcès ..l'apparition d'une infection respiratoire.

Portez plutôt des vêtements de coton propres et secs après la douche.

Ne pas partager les vêtements, le linge, les objets de toilette (rasoir, brosse à dents, déodorants, maquillage...)et tout objet personnel en contact avec la peau.

Votre maison :

Nettoyage quotidien de la maison avec votre produit habituel.

Vaisselle avec le produit habituel

Votre linge :

Lavage à la machine $\geq 40^{\circ}\text{C}$ de tout votre linge (vêtements, draps, serviettes)

Changer fréquemment les serviettes de toilettes et les draps. Éviter tout contact entre le linge sale et linge propre.



Cachet de l'établissement :



Centre d'appui Prévention Associées aux Soins de l'Océan Indien

97400 Saint Denis

Téléphone : 02 62 90 57 80


mail: cpias.oi@chu-reunion.fr

Site: www.cpias-oi.fr

INFORMATION

Sur le **STAPHYLOCOCCUS AUREUS -PVL**

Plaquette destinée au patient et son entourage



Vous êtes porteur d'un *Staphylococcus aureus* – PVL

Voici quelques précautions simples d'hygiène pour éviter de le transmettre



Qu'est-ce que le *Staphylococcus aureus* PVL ?

Le *Staphylococcus aureus* est un type de bactérie qu'on retrouve habituellement chez l'humain, sur la peau plus particulièrement dans les narines, dans les plis de la peau comme les aisselles, le tube digestif et le vagin.

En général, le *Staphylococcus aureus* appelé aussi **staphylocoque « doré »** ne cause pas d'infections chez le porteur en bonne santé. Parfois, il peut causer des infections de la peau ou des infections de plaies et, plus rarement, des pneumonies ou des infections du sang.

Certaines souches produisent des toxines comme la **Leucocidine de Panton Valentine (PVL)** qui peut provoquer des infections de la peau (comme des abcès, furoncles, plaies..) des infections respiratoires qui peuvent être graves.



Mains du porteur



Traitement

Se fait par la prise d'un antibiotique adapté



Précautions à prendre pour éviter la transmission :

Laver vous régulièrement les mains à l'eau et au savon,

- Après être allé aux toilettes
- Après vous être mouché, avoir toussé ou éternué
- Avant de préparer les repas
- Avant de manger
- Avant de prendre soin de votre enfant

Que faire si vous êtes hospitalisé ?

Signalez que vous êtes porteur de cette bactérie à votre hospitalisation

En ville

Informez les soignants (infirmier, médecin, sage femme, kiné) que vous êtes porteur de cette bactérie (existence d'une plaquette info soignants de ville sur le site cpias-oi.fr)